

いつも、インシデント報告ありがとうございます

2017.5.29

## 京大病院医療安全情報91

### 【病棟常備薬使用時の注意点】

#### 事例①【KINGのシステムチェック機能が働かない】

アセトアミノフェン末がアレルギー登録されている患者に、同成分であるカロナール錠の一般指示が入力されていたが、気づかずに服用させてしまった。

#### 事例②【オーダーと連携する一般指示が入力されていない】

一般指示が入力されているが、常備薬オーダーと連携した指示となっておらず、また、患者毎の取り寄せオーダーも行われていなかった。（※常備薬オーダーと連携していない一般指示では、別途患者毎の取り寄せオーダー入力が必要）

#### 事例③【適切に実施入力されていない】

一般指示に従い、病棟常備薬を取り出し、患者に服用させた。カルテの詳記については、記載したが、実施入力を失念した。一般指示は常備薬オーダーと連携した指示となっていたが、実施入力が適切に行われなかったため、処方が発生せず、その結果常備薬の補充も行われなかった。

常備薬オーダーと連携した一般指示の入力方法は？  
KINGのシステムチェックがかからない場合とは？

# インシデント報告に基づいた対策です

## 京大病院医療安全情報91

病棟常備薬を使用する際は下記の内容に注意して下さい

- ①病棟常備薬の持ち出し時（実施前）は、患者の**アレルギー登録内容を再度確認**してください

一般指示入力・実施時は電子カルテのチェック（用量超過、薬物間相互作用、禁忌、アレルギー など）をかけることが出来ません。



病棟常備薬の**持ち出し時**に、患者の**アレルギー登録内容を再確認**すること！

※常備薬の引き出し等に注意喚起の掲示をしました！

- ②一般指示入力時は、**可能な限りクリップ付き指示**を選択してください

セット指示 区分 疼痛時

一括選択 タイトル 【継続】対症指示

疼痛時

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	疼痛時 ⇒ ・ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」1錠 ※4時間以上あけて
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	疼痛時 ⇒ ・カロナール錠500 (500mg) 1錠 ※4時間以上あけて
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	疼痛時 ⇒ ・カロナール錠500 (500mg) 1錠 ※4時間以上あけて
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	疼痛時 ⇒ ・カロナール錠200 (200mg) 0錠 ※●時間以上あけて

### ■「0」付きの指示

実施入力時に自動で処方オーダーが発生し、翌日病棟に補充される。

### ■「0」なしの指示

実施入力しても、処方オーダーは発生しないため、補充されない。

※クリップ付き指示は常備薬限定

- ③病棟常備薬を使用した場合、**OK(病棟常備薬を使用)** から**実施登録**してください。

実施入力

継続指示には以下のオーダーが含まれています。実施するオーダーにチェックして下さい。

実施日： 2017-05-26 実施時刻： 18:10

指示を選択してください

指示	指示内容
<input checked="" type="checkbox"/>	【継続】対症指示 / 疼痛時 ⇒ カロナール錠500 (500mg) 1錠 ※4時間以上あけて1日4回まで使用可
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

種別 オーダー内容

(【継続】対症指示 / 疼痛時) 疼痛時 ⇒ カロナール錠500 (500mg) 1錠 ※4時間以上あけて1日4回まで使用可

実施確認者 倉田 山本 善

OK(病棟常備薬を使用)  OK(個人のストックから使用)  キャンセル

### ■ **OK(病棟常備薬を使用)**

このボタンを選択すると、自動で処方が発生する。

### ■ **OK(個人のストックから使用)**

このボタンを選択しても、処方は発生しない。

※常備薬の無い指示や「0」なしの指示の場合、**OK(病棟常備薬を使用)** が表示されません。

医療安全管理室・薬剤部作成